MYCOGEL е шпански патентиран производ со глобален досег на микориза кои формираат габи (**Rhizophagus irregularis**), гел формулиран во стерилни услови, совршен за апликација преку наводнување. **MYCOGEL** има најголема концентрација на ултрачисти микоризи на пазарот. Овој производ овозможува поголем раст на коренот (благодарение на габичните хифи), ја подобрува ефикасноста на апсорпцијата на вода и хранливи материи (особено фосфор **блокиран во почвата), обезбедувајќи поголема физиолошка активност и поголемо производство, во квантитет и квалитет.**

- **pH: 4 – 6**

ВОДОРАСТВОРЛИВО ЃУБРИВО



MYCOGEL



Чиста микориза во гел без глинени резидуи и други нерастворливи материи

Состав

Микоризен инокулант базиран на ***Rhizophagus irregularis*** **26x10^{7}** пропагули/L, во гел формулација. Пропагулите се збир на спори, микоризни корени и активни хифи во микоризниот инокулант. Поради гелот тие остануваат одржливи и активни повеќе од 3 години.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

НАВОДНУВАЊЕ/ПРСКАЊЕ НА ПОЧВАТА: **1** л/ха.
Се нанесува **7-10** дена пред расадувањето.
Расад: **1 ml/m²**. Нанесете доволно вода за целосно навлажнување на подлогата. Се препорачува малку посипување со вода по нанесувањето на **MYCOGEL** за целосно внесување на производот во подлогата.

Денови	0		10 – 14
	Нанесување на MYCOGEL	Намалување на ѓубрењето, особено со фосфор	Почеток на целосното ѓубрење

Think Green
ОРГАНСКИ СЕРТИФИКАТ
SHC



PATENTED PRODUCT
CSIC
ref. WO/2007/014974
Ministry of Economy and Competitiveness, Government of Spain

ОРГАНСКИ ПРОИЗВОД

¡Watch Video!

kimitec

Производител:
Agroindustrial Kimitec S.L.
Шпанија

Увозник и дистрибутер:
МАГАН - МАК ДОО Скопје
ул.Орце Николов бр.**71**, Скопје,
РС Македонија
тел.:**02/3216-147**
maganmak.com.mk



Upute za primjenu

- Napravete 1 апликација на почетокот на вегетацијата.
- Во рок од 2 недели по инокулацијата на MYCOGEL, намалете го хемиското ѓубрење, особено фосфорот. По овој временски период од 2 недели, продолжете со комплетната програма за ѓубрење.
- Пробајте да направите контакт со младите корени, се препорачува апликацијата да се направи во фаза на расад, 7 - 10 дена по пресадувањето на нива. Во случај на возрасни растенија, нанесете на местото каде што се наоѓаат младите корени.
- Погрижете се системите за наводнување да не содржат остатоци од ѓубрива, фунгициди или пестициди.
- MYCOGEL е компатибилен со фунгицидите Propamocarb, Metalaxyl, Hymexazol и Phosetyl-Al. Во случај на примена на други фунгициди, контактирајте го нашиот технички оддел.

14 дена по бербата

Без Mycogel | Со Mycogel

Без Mycogel | Со Mycogel

Подобра адаптација на почвените услови: Физички, хемиски и микробиолошки

Загарантирана соодветност за сите видови култури.

Висока приспособливост на различни услови на животната средина: високи и ниски температури, соленост и суша.