

# KESTREL КЕСТРЕЛ

системичен инсектицид

Формулација: концентрат за раствор – SL

Хемиски состав: а.м. Acetamiprid

(Ацетамиприд): 200 g/L

Фрази за опасност:

H302 – Штетен ако се прогонти;

H400 - Многу токсичен по животот свет во вода.

EUN 401 - Придржавајте се до упатството за употреба за да се избегнат ризии по здравјето на луѓето и животната средина.

Инструкции за безбедно ракување:

P202 – Да се чува под далечно од места за деца;

P272 – Да се чува под да не пие или пушчи за време на употреба;

P411 – Да се чува на температура не повисока од 40°C;

P501 – Одложување на содржината/амбалажата во согласност со локални/ регионални/ национални/ меѓународни пропис и важеќите национални прописи.



## ПРЕД ОТВАРАЊЕ НА ПАКУВАЊЕТО ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧИТА УПАТСТВОТО ЗА УПОТРЕБА

Производот може да се продава само во специјализирани продавници (земјоделски аптечки)

Дозвола од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ

Решение број: \_\_\_\_\_

Шарка: отпечатена на пакувањето

Датум на производство: стоти на секое единично пакување. Рок на траење: 3 години

Производител: ADAMA Makhteshim Ltd.

Носител на регистрацијата: ADAMA Agriculture BV

Застапник и дистрибутор: МАГАН-МАК ДОО Скопје

ул.Орице Николов бр.71 Скопје, Р.Македонија

тел.: 02/3216-147; факс: 02/3216-158

www.maganmak.com.mk

заштитно име на ADAMA Agriculture BV



Содржина:  
1 L; 0,25 L; 0,1 L



KESTREL® е инсектицид кој се карактеризира со зголемено системично и трансламинарно дејство што помага во одбрана и на вегетативни органи развиени по третирањето. Формулацијата делува на синапсите на централниот нервен систем на инсектите преку стимулирање на никотинскиот ацетилхолински рецептор.

## УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА КУЛТУРИ, ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА

За употреба на производот кај дрвенистки култури, дозите се дадени или во ml/l или во L/ha за употреба при нормални количини. Употребта во намалени количини е дозволена само со соодветна опрема, која се однесува исклучиво на дозите по хектар прикажани на етикетата. За широките, индустриски и градинарски култури, упатството за дозирање е дадено исклучиво во L/ha за употреба во нормални количини. Користите ги поголемите дози со висок интензитет на притисок од инсекти, скогаш почтивувајќи ја максималната доза по хектар означенa за секоја култура.

**Агрими Против:** Лимонов минер (*Phyllocoptis citrella*) во доза од 35-50 ml / hl (0,5-0,7 L / ha); Лисни вошки (*Aphis gossypii*, *Aphis spiracula*, *Toxoptera aurantii*) во доза од 25-50 ml / hl (0,35 L / ha) и 14 дена каренца; млади форми на Штестита вошка (*Aonidiella aurantii*) во доза од 50-70 ml / hl (1,5 L / ha) и каренца од 30 дена. Да се направат максимум 2 третирања годишно со интервал помеѓу примените од најмалку 30 дена, интервенирајќи од фазата на продолжување на никупилите до боенje на плодовите.

**Овошни дрвца (јаболко и круша) Против:** Лисни вошки (*Aphis pomi*, *Dysaphis plantaginea*, *Dysaphis pyri*), Оси (*Holocampus Spp.*), Минери (*Leucoptera malifoliae*, *Phyllonorycter corifoliae*, *Phyllonorycter blancardella*) да се користи во доза од 25-35 ml / hl (0,25-0,35 L / ha); Јаболков црв (*Cydia pomonella*) 35-50 ml / hl (0,35-0,5 L / ha). Да се направат максимум 2 третирања годишно со интервал помеѓу прскањата од најмалку 8 дена интервенирајќи од фазата на глувчешките уши, почтивувајќи го периодот на каренца.

**Кајсија, праска, нектарина Против:** Лисни вошки (*Brachycaenus sp.*, *Myzus persicae*), Цикади (*Jacobiasca lyciba*, *Empoasca spp.*), во доза од 25-35 ml / hl (0,25-0,35 L / ha); Трпци (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips sp.*), Микропепулодроптера - пеперутки (*Anarsia lineatella*, *Cydia molesta*) во доза од 35-50 ml / hl (0,35-0,50 L / ha). Да се направат максимум 2 третирања годишно со интервал помеѓу прскањата од најмалку 20 дена интервенирајќи од фазата на пукане на пуките почтивувајќи го периодот на каренца.

**Слива Против:** Лисни вошки (*Myzus sp.*, *Hyalopterus pruni*), Пеперутки (*Cydia funebrana*, *Leucoptera malifoliae*, *Phyllonorycter blancardella*) во доза од 25 ml / hl (0,25 L / ha). Да се направат максимум 2 третирања годишно со интервали помеѓу прскањата од најмалку 20 дена од фазата на видливите дршки почтивувајќи го периодот на каренца.

**Цреша Против:** Лисни вошки (*Aphis spp.*, *Myzus cerasi*), Цршевата мува (*Rhagoletis cerasi*) во доза од 15-35 ml / hl (0,25-0,35 L / ha). Да се направат максимум 2 третирања годишно со интервал помеѓу примените од најмалку 14 дена од фазата на пукане на пуките почтивувајќи го периодот на каренца.

**Лоза (за вински и десертни сорти) Против:** Цикади (*Scaphoideus titanus*, *Empoasca vitis*), Гроздов молец (*Lobesia botrana*) во доза од 25-45 ml / hl (0,35-0,45 L / ha). Да се направи 1 третирање од фазата на појава на чутеште почтивувајќи го периодот на каренца.

**Маслодайна дрвка Против:** Тврдокрилци (*Phyllotreta atrata*, *Psylliodes chrysocerpha*, *Ceuthorrhynus spp.*, *Meligethes aeneus*), Лисни вошки (*Aphis spp.*, *Myzus persicae*) во доза од 0,25-0,3 L / ha. Да се направат максимум 2 третирања годишно со интервал помеѓу прскањата од најмалку 7 дена интервенирајќи од фазата на пуштање на котиледони почтивувајќи го периодот на каренца.

**Компир Против:** Лисни вошки (*Myzus persicae*, *Macrosiphum spp.*), Комирови врапчици (*Leptinotarsa decemlineata*) во доза од 0,15-0,2 L / ha. Да се направат максимум 2 третирања во циклусот на културата со интервал помеѓу прскањата од 7 дена од фазата на пуштање на првите листови почтивувајќи го периодот на каренца.

**Домат, модар патлијан, пиперка (на отворено поле и стапка) Против:** Лисни вошки (*Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*) во доза од 0,25 L / ha; Белоокрилци (*Triauleurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*) во доза од 0,35-0,5 L / ha. Да се направат максимум 2 третирања во циклусот на културата со интервал помеѓу прскањата од 20 дена од фазата на пуштање на котиледони почтивувајќи го периодот на каренца.

**Брокула, кафрилон, зелка Против:** Лисна вошка (*Brevicoryne brassicae*), Пеперутки (*Plutella xylostella*) во доза од 0,25-0,35 L / ha. Да се направи 1 третирање во циклусот на културата почтивувајќи го периодот на каренца.

**Марула, зелена и друга салата (освен млади листови) Против:** Лисни вошки (*Nasonovia ribis-nigri*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*) во доза од 0,25-0,35 L / ha.

Да се направи 1 третирање во циклусот на културата почтивувајќи го периодот на каренца.

**НАПОМЕНА:** Да не се употребува за време на цветање и ентомофилно опрашување на културите. Се препорачува да се обезбеди целосно и еднообразно навлажнување на целата вегетација маса, користејќи поголеми количини на вода и повисок притисок на културите кои потешкото се навлажнуваат. Во случај на намалени количини на употреба, да се зголеми концентрацијата на растворот со цел да се задржи истата доза на производот по хектар што се користи во третманите со нормална количина

**УПРАВУВАЊЕ СО ОТПОРНОТ** за да се избегне појава на отпорност, потребно е да се заменат производи со различни механизми на дејствување и во случај на мешавини популации на инсекти употребете KESTREL® во најновиота доза означенa на етикетата за културата или да се примени KESTREL® во мешавина со производи кои содржат различен механизам на дејствување.

**КОМПАТИБИЛНОСТ** Во случај на мешавине со формулации базирани на ново воведени активни супстанции, да се направат предимнини тести за можност да мешавише пред да се третираат целиите култури. Напомена: Во случај на мешавине со други формулации, мора да се почтува најдолготиот период на каренца и најстрекливите правила на претпазливост меѓу оние на производите со мешавина. **КАРЕНЦА:** 60 дена за грежуб, јаболко и портокал, 30 дена за други аргуми (14 дена доколку се нанесува на максимум 0,7 L / ha за сите аргуми), 28 дена за маслодайна репка, 14 дена за кафрилон, брокула, зелка, овошни дрвца, кајсија, праска, нектарина, слива, 7 дена за лоза, марула, зелена салата и останати салати, компир, пиперка, модар патлијан, домат. 3 дена за цреша и во случај на примената на стапките како модар патлијан и домат.

**ФИТОТОКСИЧНОСТ (осетливост на културите на препаратот):** Применет во пречупувачите количини на концентрации на правлен начин и во оптимално време, не е фитотоксичен за наведените култури.

**ПОДГОТВОВА НА СРЕДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА:** Проприоната количина од средството се иструва во разредувачот на прскапката, кој е до половина наполнет со чиста вода и постојано се меша со додадуваче на вода, се додека се наполнет резервоарот.

**ЗАДОЛЖИТЕЛНИ МЕДРИДИ ПРИ УПОТРЕБА:** При употреба на препаратот во предвидените концентрации од страна на производителот или дистрибуторот, односно потрошувачите, доколку се применети мерки за заштита при работата и ако се придржува до упатството за употреба. Примената на средството треба да го врати оспособени лица соносно на заштита на општиот наорач или визир, а особено при употреба на средство. Доколку постои опасност од прскање на хемикалијата, заштита да се употреби гумена кефела. После работа со препаратор задолжително да се измийте рацете и изложите депови од теплота вода и сапун.

**ЗНАЦИ НА ТРУПЕЦИ И ПРВА ПОМОКСУ:** Во случај на контакт со кожа: да се соблече нечистата облека и теплота да се измийте со много вода и сапун. Пред повторна употреба на работната облеката да се испре. Во случај на контакт со очите: Веднаш измийте ги со много вода. По првична измивка: отстранете ги контактните линии и продолжите со измивач најмалку 15 минути. Држете ги очите широки отворени додека ги плаќате. Ако симптомите продолжат, јавете се на лекар.

Во случај на вдихување: Да се извадат свежи воздух. Ако дишењето е неправилно или затревено, спроведете вртежка дишница, да се извадат свежи воздух. Ако дишењето е затревено, спроведете вртежка дишница, да се извадат свежи воздух. Ако симптомите се истини задолжително да се повика лекар.

**АНТИДОТ:** Нема специфичен антидот, потребно е симптоматско лекување.

**МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА:** Во текот на примената треба да се спречи загадувањето на водата. За заштита на водите организми, потребно е да се почнува безбедносниот појас кој не се третира од површинските водни тела. 20 метри вегетација за примената кај овошни дрвца, праска, кајсија, нектарина, домат, модар патлијан, пиперка, брокула, зелка, марула, зелена салата и други култури. Во случај на примената на водите организми, потребно е да се измийте со измивач најмалку 15 минути.

**ЗАШТИТНИ МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА ПРЕВОЗ:** За запакирање на опаковките кои не се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 15 минути. За запакирање на опаковките кои се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 30 минути.

**СИМПТОМИ:** За запакирање на опаковките кои не се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 15 минути. За запакирање на опаковките кои се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 30 минути.

**СИМПТОМИ:** За запакирање на опаковките кои не се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 15 минути. За запакирање на опаковките кои се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 30 минути.

**СИМПТОМИ:** За запакирање на опаковките кои не се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 15 минути. За запакирање на опаковките кои се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 30 минути.

**СИМПТОМИ:** За запакирање на опаковките кои не се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 15 минути. За запакирање на опаковките кои се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 30 минути.

**СИМПТОМИ:** За запакирање на опаковките кои не се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 15 минути. За запакирање на опаковките кои се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 30 минути.

**СИМПТОМИ:** За запакирање на опаковките кои не се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 15 минути. За запакирање на опаковките кои се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 30 минути.

**СИМПТОМИ:** За запакирање на опаковките кои не се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 15 минути. За запакирање на опаковките кои се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 30 минути.

**СИМПТОМИ:** За запакирање на опаковките кои не се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 15 минути. За запакирање на опаковките кои се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 30 минути.

**СИМПТОМИ:** За запакирање на опаковките кои не се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 15 минути. За запакирање на опаковките кои се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 30 минути.

**СИМПТОМИ:** За запакирање на опаковките кои не се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 15 минути. За запакирање на опаковките кои се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 30 минути.

**СИМПТОМИ:** За запакирање на опаковките кои не се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 15 минути. За запакирање на опаковките кои се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 30 минути.

**СИМПТОМИ:** За запакирање на опаковките кои не се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 15 минути. За запакирање на опаковките кои се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 30 минути.

**СИМПТОМИ:** За запакирање на опаковките кои не се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 15 минути. За запакирање на опаковките кои се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 30 минути.

**СИМПТОМИ:** За запакирање на опаковките кои не се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 15 минути. За запакирање на опаковките кои се ценат на третирања, треба да се користи измивач најмалку 30 минути.

