

MIRAGE 45 EC[®]

а.м. Prochloraz 450 g/L

Фунгицид со протективно и ерадиктивно дејство

Фунгицид за сузбијање на причинителите на широк спектар на болести во:

ОВОШТАРСТВО: кајсија, вишна, цреша, слива



ПОЛЕДЕЛСТВО: пченица, есенски јачмен, пролетен јачмен, сончоглед



Производител:
ADAMA Makhteshim Ltd.



Застапник и дистрибутер:
МАГАН-МАК ДОО Скопје
ул. Орце Николов бр. 71 Скопје, Р. Македонија
тел.: 02/3216-147; факс: 02/3216-158
www.maganmak.com.mk
® заштитено име на ADAMA Agriculture BV

Култура	Дози	Примена	Каренца
Кајсија	0,3-0,5 L/ha со 800-1000 L/ha вода	Кадравост на лисјата (<i>Taphrina deformans</i>), сачменка кај коскестите овошни видови (<i>Clasterosporium carpophilum</i>), монилија (<i>Monilia laxa</i>), гниење на плодовите (<i>Monilia fructigena</i>). Како превенција и заштита против кадравост на листовите, се третира по фазата на цветање. Во зависност од степенот на инфицираност се применува 3-4 пати на 10-14 дена.	30 дена
Вишна Цреша	0,3-0,5 L/ha со 800-1000 L/ha вода	Монилија (<i>Monilia laxa</i>) и гниење на плодовите (<i>Sclerotinia fructigena</i>), сипаница на вишната (<i>Blumeriella jaapii</i>), сачменка кај коскести овошни видови (<i>Clasterosporium carpophilum</i>). Третирањето се врши со појава на бела папка и уште едно или две третирања за време на цветањето. По бербата на родот може повторно да се користи против болестите на листовите како и против монилија и гниење на плодовите.	30 дена
Слива	0,3-0,5 L/ha со 800-1000 L/ha вода	Сачменка кај коскести овошни видови (<i>Clasterosporium carpophilum</i>), гниење на плодовите (<i>Monilia fructigena</i>)	30 дена
Житни култури (пченица, есенски и пролетен јачмен)	1 L/ha со 300-400 L/ha вода	Пепелница (<i>Erysiphe graminis</i>), полегнување на стеблото-гниење на коренот и приземниот дел од стеблото (<i>Ophiobolus graminis</i>), кафеава лисна дамкавост (<i>Lepiosphaeria herpotrichoides</i>), фузариум (<i>Fusarium spp.</i>) Се третира во крајната фаза од ртењето до почетокот на формирање на вретеното, а потоа на крајот од формирањето на класот до почетната фаза на формирањето на цветовите	28 дена
Сончоглед	0,6 – 1 L/ha со 300 L/ha вода	Се употребува за сузбивање на габична инфекција на стеблото и плодот. За превенција и заштита од заболувања на стеблото и плодот, се препорачува комбинација со други видови фунгициди со активна материја folpet. Се препорачува да се извршат две третирања. Првото третирање да се изврши во фаза на 6-8(10) листови. Второто третирање во почетна фаза на цветање.	28 дена

Напомена

-Податоците кои се содржат во овој проспект се базирани на експерименти и овластувања добиени од официјални институции, меѓутоа сепак се од информативен карактер.

За правилна употреба и постапка со производот задолжително да се прочита упатството за употреба.

ADAMA и застапникот МАГАН-МАК Скопје немаат одговорност при погрешна употреба на препаратурот, спротивно од дадените инструкции.