

# Tolurex 50 SC<sup>®</sup>

а.м. Chlorotoluron 500 g/L

**Селективен хербицид**



**Селективен хербицид за сузбивање на  
едногодишни теснолисни и широколисни плевели во:  
ЗИМСКА ПЧЕНИЦА И ЗИМСКИ ЈАЧМЕН**



Производител:  
ADAMA Agan Ltd.



Застапник и дистрибутер:  
**МАГАН-МАК ДОО Скопје**  
ул. Орце Николов бр. 71 Скопје, Р. Македонија  
тел.: 02/3216-147; факс: 02/3216-158  
[www.maganmak.com.mk](http://www.maganmak.com.mk)  
<sup>®</sup>заштитено име на ADAMA Agriculture BV

Култура	Дози	Примена
Зимска пченица  Зимски јачмен	3,5-4 L/ha (35-40 mL/100m <sup>2</sup> )  со 200-400 L/вода	Се третира наесен по сеидба, пред никнење на културата.  Ги сузбива плевелите: лисичина опашка ( <i>Alopecurus myosuroides</i> ), ветрушка ( <i>Apera spica-venti</i> ), полска незаборавка ( <i>Myosotis arvensis</i> ), едногодишна ливадарка ( <i>Poa annua</i> ), полски вртипоп ( <i>Anthemis arvensis</i> ), див овес ( <i>Avena fatua</i> ), камилица безмирисна ( <i>Matricaria inodora</i> ), обичен костреш ( <i>Sonchus oleraceus</i> ), лековита камилица ( <i>Matricaria chamomilla</i> ), самоникната маслодајна репка ( <i>Brassica napis L.subsp.napus</i> ), гладниче ( <i>Erophila verna</i> ), див синап ( <i>Sinapis arvensis</i> ), полска пршленка ( <i>Spergula arvensis</i> ), овчарска торбичка ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ), булка ( <i>Papaver rhoeas</i> ), синчец ( <i>Centaurea cyanis</i> ), пијавец ( <i>Lolium multiflorum</i> ) и обична росница ( <i>Fumaria officinalis</i> ).
	2,5-3 L/ha (25-30 mL/100m <sup>2</sup> )  со 200-400 L/вода	Може да се третира и по никнување, кога културата е во развојна фаза од 1 до 3 листа, до фаза на братење (по скалата BBCH 11-21).  Ги сузбива плевелите: црвена мртва коприва ( <i>Lamium purpureum</i> ), обична свездарка ( <i>Stellaria media</i> ), дворски повит ( <i>Polygonum persicaria</i> ), ползесто лутиче ( <i>Ranunculus repens</i> ), граор ( <i>Vicia cracca</i> ), лисичина опашка ( <i>Alopecurus myosuroides</i> ), ветрушка ( <i>Apera spica-venti</i> ) и амброзија ( <i>Ambrosia sp.</i> ).

**Предупредување:** Tolurex 50 SC може да се употреби на иста површина најмногу еднаш во една сезона. Tolurex 50 SC не смее да се користи во доцна сеидба или кога постои опасност од мраз. Исто така не смее да се употребува кај зимска пченица на лесна почва, со ниска вредност на органски материи (под 1,2%), бидејќи предизвикува фитотоксичност. На изразито тешка почва и на земјиште со висока содржина на органски материи (над 6%) може да се намали неговата ефикасност.

**Каренца:** Обезбедена со времето на употреба.

**Фитотоксичност:** Tolurex 50 SC не е фитотоксичен, ако се употребува како што е наведено во упатството за употреба. Одредени сорти можат да бидат чувствителни на активната материја chlorotoluron.

### Напомена

- Податоците кои се содржат во овој проспект се базирани на експерименти и овластувања добиени од официјални институции, меѓутоа сепак се од информативен карактер.

За правилна употреба и постапка со производот задолжително да се прочита упатството за употреба.

ADAMA и застапникот МАГАН-МАК Скопје немаат одговорност при погрешна употреба на препаратот, спротивно од дадените инструкции.