

# КОНИНОР 200 SL®

а.м. Imidacloprid 200 g/L

## Системичен инсектицид

Делува контактно и дигестивно.  
Има добро системично дејство и преку коренот на растенијата.



Ги сузбива штетните инсекти во:

**ГРАДИНАРСТВОТО:** пиперка, домати, модар патлиџан, краставица, тиквички

**ПОЛЕДЕЛСТВО:** компир, тутун

Производител:



ADAMA Celsius BV

Дистрибутер:



Застапник и дистрибутер:

**МАГАН-МАК ДОО** Скопје

ул. Орце Николов бр. 71 Скопје, Р. Македонија

тел.: 02/3216-147; факс: 02/3216-158

[www.maganmak.com.mk](http://www.maganmak.com.mk)

® заштитено име на ADAMA Agriculture BV



Култура	Дози	Забелешки	Каренца
Пиперка, Домат, Модар патлиџан	0,7-0,75 L/ha	За сузбивање на лисни вошки ( <i>Aphidae</i> ), белокрилка ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ). Се третира по појавувањето на првите крилести единки, почетокот на првите оформени мали колонии. Се употребува во производство на расад и во вегетација на културата. Може да се применува и преку систем за наводнување капка по капка. Третирањето се врши до формирање на плодовите.	3 дена
Краставици, тиквички	0,75 L/ha	За сузбивање на лисни вошки ( <i>Aphidae</i> ), белокрилка ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ). Се третира по појавувањето на првите крилести единки, почетокот на првите оформени мали колонии. Третирањето се врши до формирање на плодовите.	3 дена
Компир	0,3 L/ha	За сузбивање на лисни вошки ( <i>Aphidae</i> ), компирова златица ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> ). За сузбивање на компирова златица, се третира кога е во фаза на млади ларви. А за сузбивање на лисни вошки, во почетокот на првите оформени мали колонии.	28 дена
Тутун	0,25 L/ha	За сузбивање на лисни вошки ( <i>Aphidae</i> ), тутунски трипс ( <i>Trips tabaci</i> ). Се третира по појавувањето на првите крилести единки, почетокот на првите оформени мали колонии. Третирањето се врши до појава на цветни пупки. За производство на расад се третира почвата пред садење, во доза од 0,7 L/ha.	14 дена

#### Напомена:

Може да се употребува на иста површина во текот на една вегетација најмногу два пати. Не смее да се употребува за време на цветање.

#### Напомена

-Податоците кои се содржат во овој проспект се базирани на експерименти и овластувања добиени од официјални институции, меѓутоа сепак се од информативен карактер.

За правилна употреба и постапка со производот задолжително да се прочита упатството за употреба. ADAMA и застапникот МАГАН-МАК Скопје немаат одговорност при погрешна употреба на препаратот, спротивно од дадените инструкции.