

MAVRIK 24 EW®

а.м. Tau-fluvalinate 240 g/L

Инсектицид и акарицид со контактно и стомачно дејство

Единствен инсектицид кој може да се користи
за време на цветање на растенијата.

Не делува на пчелите и природните непријатели
на инсектите.



Предности:

- Нова молекула со нов начин на дејство, ги сузбива сите штетници кои имаат појавено резистентност на другите препарати.
- Ефикасен и при високи температури.
- Широк спектар на делување што резултира со одлична контрола на штетниците.
- Нема влијание врз корисните инсекти и е погоден во програмите за интегрална заштита.



Производител:
ADAMA Irvita NV.



Застапник и дистрибутер:
МАГАН-МАК ДОО Скопје
ул. Орце Николов бр.71 Скопје, Р.Македонија
тел.: 02/3216-147; факс: 02/3216-158
www.maganmak.com.mk
®заштитено име на ADAMA Agriculture BV

Култура	Дози	Штетни инсекти	Каренца
Јаболчесто овошје	0,01-0,02%	Лисни вошки (<i>Aphididae</i>), лисни болви (<i>Psila sp.</i>)	75 дена
Слива	0,01-0,02%	Лисни вошки (<i>Aphididae</i>)	21 дена
Праска Нектарина Кајсија Цреша	0,01-0,02%	Лисни вошки (<i>Aphididae</i>)	—
	0,04-0,06%	Трипси (<i>Thrips sp.</i>)	
	0,02-0,03%	Зелена цикада (<i>Empoasca libica</i>)	
Цитруси	0,01-0,02%	Лисни вошки (<i>Aphididae</i>), штитести вошки (<i>Saissetia sp.</i>),	28 дена
	0,03-0,04%	Цитрусов молец (<i>Prays sp.</i>)	
Бадем	0,01-0,02%	<i>Tomicus piniperda</i> , бадемова стеница (<i>Monosteria unicostata</i>), зелена цикада (<i>Empoasca libica</i>)	7 дена
Домат Зелена боранија Компир Артичока	0,01-0,02%	Белокрилка (<i>Aleyrodidae</i>), лисни вошки (<i>Aphididae</i>), трипси (<i>Thrips spp.</i>), совици (<i>Noctuidae</i>), компирова златица (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	Домат, зелена боранија 7 дена Компир, артичока -14 дена
Марула	0,02-0,04%	Лисни вошки (<i>Aphididae</i>) Максимум 2 апликации во интервал од 7 – 14 денови. Максимална доза на едно третирање од 0,1-0,4 L/ha со 500-1000 L вода	14 дена
Пченица	0,01-0,02%	Стеница (<i>Aelia spp.</i>)	14 дена
Памук	0,01-0,02%	Лисни вошки (<i>Aphididae</i>), трипси (<i>Thrips spp.</i>)	7 дена
	0,01-0,05%	Црвен пајак (<i>Tetranychidae</i>)	
	0,03-0,04%	Памуков молец (<i>Pectinophora gossypiella</i>), совици (<i>Noctuidae</i>)	
Луцерка	0,01-0,02%	Лисни вошки (<i>Aphididae</i>), луцеркин сурлаш (<i>Apion pisi</i>), луцеркин сурлаш (<i>Sitona humeralis</i>)	14 дена
Декоративни растенија и дрвја	0,01-0,02%	Лисни вошки (<i>Aphididae</i>), трипси (<i>Thrips spp.</i>)	—
	0,03-0,04%	Совици (<i>Noctuidae</i>)	
	0,01-0,05%	Црвен пајак (<i>Tetranychidae</i>)	

ОГРАНИЧУВАЊА

Во една сезона се препорачува едно до две третирања во зависност од културата која треба да се третира. Да не се третира во стакленици, ниту во затворени простории.

Кај коскесто овошје (праска, нектарина, кајсија, цреша), да се третира до цветање.

Напомена

-Податоците кои се содржат во овој проспект се базирани на експерименти и овластувања добиени од официјални институции, меѓутоа сепак се од информативен карактер.

За правилна употреба и постапка со производот задолжително да се прочита упатството за употреба.

ADAMA и застапникот МАГАН-МАК Скопје немаат одговорност при погрешна употреба на препаратот, спротивно од дадените инструкции.