

NEMACUR 40 LE

Активна материја: Фенамипhos 400 гр/л

Хемиска група: органофосфорни соединенија

Формулација: Концентрат за емулзија (EC)

NEMACUR 40 LE е нематоцид со системично и контактено дејство за почвено третирање. Ги сузбива сите штетни нематоди ектопаразити и ендопаразити.

Растенијата NEMACUR 40 LE го апсорбираат преку кореновиот систем, а отаму се транслоцира во другите делови на растенијата.



Застапник и дистрибутер:
МАГАН-МАК ДОО Скопје
ул. Орце Николов бр.71 Скопје, Р. Македонија
тел.: 02/3216-147; факс: 02/3216-158
www.maganmak.com.mk

 **AMVAC**

Производител: AMVC Netherlands B.V.

NEMACUR 40 LE

Примена

NEMACUR 40 LE е системичен нематоцид за сузбивање на штетните ектопаразитни и ендопаразитни нематоди.

Ги сузбива нематодите од: *Meloidogyne sp.* (предизвикувачи на гали), *Heterodera sp.* (предизвикувач на цисти), *Pratylenchus sp.*, *Tylenchulus sp.* и другите нематоди во почвата и нематоди на листовите.

Начин и време на примена

Може да се аплицира преку системот за наводнување капка-по-капка во стакленици и пластеници, а на отворено се третира со стандардни прскалицы на површината на почвата со инкорпорација.

Во градинарски култури: Тиквица, диња, краставица, пиперка, лубеница и домати, NEMACUR 40 LE се користи со 2 третирања на отворено, при што дозата се дели на половина, ако времетраењето на културите дозволи да се спазат каренците. Првото третирање се врши пред сеењето или пресадувањето, а второто третирање се врши за време на периодот на вкоренување на културата, а пред почетокот на цветањето.

Дози на примена

Градинарски култури: Тиквица, диња, краставица, пиперка, лубеница и домати, NEMACUR 40 LE се користи во дози од 12-25 л/ха

Винова лоза:

Во доза од 25-50 л/ха.

Украсни растенија:

Во доза од 12-25 л/ха.

NEMACUR[®] 40 LE



NEMACUR 40 LE

Напомена

-Ако се третира со стандардни прскалки да се избегнува прскање при висока температура и силен ветер да се спречи средството да дојде до соседните култури и водените ресурси.

-Средството е отровно за луѓето и топлокрвните животни при употреба и ракување да се почитуваат мерките за безбедност според упатството за употреба.

Фитотоксичност

Применет во препорачаните дози и концентрации на правилен начин и во оптимално време, NEMACUR 40 LE не е фитотоксичен за третираните култури.

Каренца

Тиквица, диња, лубеница, краставица, пиперка, домати – 60 дена


Винова лоза – 90 дена

Резидуи

Домат, пиперка, тиквица, лубеница – 0,5 мг/кг

Краставица, диња – 0,2 мг/кг

NEMACUR[®] 40 LE



NEMACUR 40 LE

Предности

Има одлично секундарно дејство за сузбивање на други штетници како што се: инсекти со устен апарат за бодеење и смукање, подвижни форми на фитофагни пајачиња, трипси, белокрилки, други штетници.

Пакување: 1л; 0,1л

Напомена

Податоците кои се содржат во овој проспект се базирани на експерименти и овластувања добиени од официјални институции, меѓутоа сепак се од информативен карактер.

За правилна употреба и постапки со производот задолжително да се прочита упатството за употреба.

AMVC Netherlands B.V. и застапникот за РМ, Маган-Мак немаат одговорност при погрешна употреба на препаратот, спротивно на дадените инструкции.



Застапник и дистрибутер:
МАГАН-МАК ДОО Скопје
ул. Орце Николов бр.71 Скопје, Р. Македонија
тел.: 02/3216-147; факс: 02/3216-158
www.maganmak.com.mk

 **AMVAC**

Производител: **AMVC Netherlands B.V.**