



YaraVita™

# ZINTRAC 700



**Висококонцентрирана течна формулатија за третирање во услови на дефицит на цинк преку фолијарна апликација**

#### Состав:

70% маса/волумен = 700 гр/л Цинк (Zn)

#### Карактеристики на производот и придобивки од него

- ♦ највисока концентрација на цинк
- ♦ речиси осум пати повеќе цинк од типичниот течен хелат
- ♦ 4-5 пати повеќе цинк од „типична“ течност
- ♦ погоден за речиси секоја мешавина
- ♦ дава поголема флексибилност при препораките за употреба на отворено
- ♦ има одлична апсорпција од страна на растението
- ♦ обезбедува значително количество цинк
- ♦ брзо се апсорбира од страна на културата
- ♦ многу е мобилен во растението
- ♦ има долготраен ефект на исхрана
- ♦ формулацијата е многу безбедна

#### ДОЗИ И ВРЕМЕ НА АПЛИКАЦИЈА

- **Јаболко, круша:** 1-2 л/ха при појавата на пупките и до крај на цветањето. Да се одбегнува апликација во текот на цветањето. Аплицирајте повторно по берба пред стареењето на лисјата. Да се третира со: 200-1000 л/ха.
- **Цреша, слива:** 1-2 л/ха, се аплицира при зимско пупење или појава на розеви пупки и повторно по берба, но пред стареење на лисјата. Да се третира со: 500-1000 л/ха вода.
- **Винова лоза:** 1 л/ха. Две апликации: издолжување на ресите и пред

цутење.

- **Зелка:** 1 л/ха во фазата со 4-9 лисја. Да се третира со: 200 л/ха вода.
- **Морков:** 1 л/ха, кога културата е висока 15 см. При умерен до голем дефицит апликации на секои 10-14 дена. Да се третира со: 200 л/ха вода.
- **Жита:** 1-2 л/ха од фазата со 2 листа до формирањето на првиот нодиум. Да се третира со: 200 л/ха вода.
- **Трева (за тревници):** 1 л/ха штом започне растот во пролет и/или по увидувањето дека има потреба од апликација. аплицирање на секои 10-14 дена според потреба. Да се третира со: 200 л/ха вода.
- **Кромид, праз:** 1 л/ха, се аплицира кога има доволно лисна површина што ќе го пресретне прсканиот материјал. Да се третира со: 200 л/ха вода.
- **Пченка:** 1 л/ха од фазата со 3-8 лисја. При голем дефицит, повторни апликации на секои 10-14 дена. Да се третира со: 200 л/ха вода.
- **Грашок:** 0,5-1 л/ха се аплицира кога културата е со висина 5-15 см. Да се третира со: 50-200 л/ха вода.
- **Малина:** 0,5 л/ха, се аплицира кога пупките се зелени. Да се третира со: 200 л/ха вода.
- **Јагоди (одгледувани на отворено):** една апликација од 0,5 л/ха кога пупките се зелени, а потоа две апликации од по 0,25 л/ха, кога пупките се бели и кога културата расте по берба. Да се третира со: 200-500 л/ха вода.
- **Заштитени простори и пластеници:** 0,05 литри на 100 литри вода максимална концентрација. Да се третира со: максимум 1000 л/ха вода. **Важно: Не смее да се надмине дозата од 5 мл на 10 л вода аплицирани на површина од 100 м<sup>2</sup>.**
- **Апликација на почва:** 3-10 л/ха, се аплицира пред садењето (или пред растот на повеќегодишните култури). Да се третира со: минимум 50 л/ха вода.

